Faunitaxys

Revue de Faunistique, Taxonomie et Systématique morphologique et moléculaire

Volume 14
Numéro 13

Février 2026

ISSN (Print) : 2269 - 6016
ISSN (Online) : 2970 - 4960
Dépôt légal : Février 2026

Faunitaxys

Revue de Faunistique, Taxonomie et Systématique morphologique et moléculaire

ZooBank : https://zoobank.org/79A36B2E-F645-4F9A-AE2B-ED32CE6771CC

Directeur de la publication, rédacteur, conception graphique et PAO:
Lionel Delaunay

Cette revue ne peut pas être vendue
Elle est distribuée par échange aux institutions (version papier)
et sur simple demande aux particuliers (format PDF)
à l'adresse suivante:

AFCFF (Association française de Cartographie de la Faune et de la Flore)
28, rue Voltaire, F- 42100 Saint Etienne
E-mail: faunitaxys.journal@gmail.com

Elle est disponible librement au téléchargement à partir du site:

https://faunitaxys.fr/

La parution de *Faunitaxys* est apériodique

Faunitaxys est indexé dans / ***Faunitaxys*** is indexed in:
- Zoological Record
Articles and nomenclatural novelties are referenced by:
- ZooBank (https://zoobank.org)
Online Archives:
- HAL (https://hal.archives-ouvertes.fr)
- Internet Archive (https://archive.org/details/faunitaxys)

Imprimée sur les presses de SPEED COPIE, 6, rue Tréfilerie, F- 42100 Saint-Etienne

Imprimé le 27 02 2026

https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(13)

Ctenuchina de Guyane française (2de partie). Les genres *Leopardellus* - *Prosopidia* - *Bipartes* - *Apoheliura* - *Passineura* & *Veraneacerea* (3d article). 20e note

JEAN-AIMÉ CERDA

BP 98, 97357 Matoury Cedex, Guyane française - patawa2@gmail.com
- ZooBank : https://zoobank.org/CA09A38F-CFCC-47BB-BE4F-C632F6AD83C6

Mots-clés :

Erebidae ;
Arctiinae ;
Ctenuchina ;
Leopardellus ;
Prosopidia ;
Bipartes ;
Apoheliura ;
Passineura ;
Veraneacerea ;
taxonomie ;
Guyane française.

Résumé. – Dix espèces de Guyane sont traitées. Deux genres sont inventés : *Bipartes* **gen**. **nov**., *Leopardellus* **gen**. **nov**. Trois espèces sont révisées : *Acridopsis lucis* (Butler, 1878) **stat**. **rev**., *Veraneacerea hampsoni orientalis* **(**Rothschild,1912) **stat**. **rev**., *Scepsis trifasciata* Butler, 1877 **stat**. **rev**. Six combinaisons sont nouvelles : *Leopardellus quadricolor* (Walker, 1855) **comb**. **nov**., *Leopardellus formosus* (Dognin, 1905) **comb**. **nov**., *Leopardellus dognini* (Rothschild, 1912) **comb**. **nov**., *Bipartes lucis* (Butler, 1878) **comb**. **nov**., *Bipartes peruana* (Pinheiro & Duarte, 2016) **comb**. **nov**., *Passineura trifasciata* (Butler, 1877) **comb**. **nov**. Deux synonymies sont confirmées : *Veraneacerea hampsoni orientalis* **(**Rothschild,1912) **syn**. **conf**., *Passineura trifasciata* (Butler, 1877) **syn**. **conf**. Trois espèces sont nouvelles pour la Guyane : *Leopardellus quadricolor* (Walker, 1855), *Bipartes lucis* (Butler, 1878), *Veraneacerea hampsoni hampsoni* **(**Rothschild,1912).

Cerda J.-A., 2026. – Ctenuchina de Guyane française (2de partie). Les genres *Leopardellus* - *Prosopidia* - *Bipartes* - *Apoheliura* - *Passineura* & *Veraneacerea* (3e article). 20e note. *Faunitaxys*, 14(13) : 1 – 16.

DOI : https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(13)

ZooBank : https://zoobank.org/28C04395-301F-4E5E-905A-E264137083C7

Received: 01/02/2026 – *Revised*: 04/02/2026 – *Accepted*: 05/02/2026

Le matériel examiné provient des collections suivantes

JAC - Jean-Aimé Cerda,
PC - Philippe Collet,
SF - Serge Fernandez,
BF - Bernard François,
BH - Bernard Hermier,
ML - Michel Laguerre,
OL - Olivier Laurent,
TR - Thibault Rosant,
TT - Tony Tassel.

Anagrammes des institutions

USNM - The United States National Museum (Washington),
OX - Oxford University Museum (Oxford),
NHM - The Natural History Museum (Londres).

Leopardellus **gen**. **nov**.

ZooBank : https://zoobank.org/B3B14E13-4DE5-4D94-88B9-86357CA2DAFA

Espèce type : ***Eucereon formosum*** Dognin, 1905.

Description du genre

Par l'habitus les espèces de *Leopardellus* **gen**. **nov**. ont les ailes postérieures triangulaires et bien développées. La nervation des ailes postérieures (Fig. 1) se présente comme suit : CuA2 naissant plus ou moins des 2/3 de la cellule (D/C = de 0,39 à 0,55) [voir Cerda, 2020], CuA1 naissant juste en dessous de M3, M3 naissant de l'angle inférieur de la cellule, M2 naissant juste au dessus de M3 sur la discocellulaire, M1 et Rs de l'angle supérieur de la cellule, pas de nervure Sc+R1.
Les genitalia (Pl. 5, Fig. 20) ont un uncus long et fin ; les valves symétriques atteignant l'apex de l'uncus peuvent finir bicuspides. Apophyses du tegumen à la base de l'uncus se dirigeant vers l'avant et bien développées ; juxta courte ; aedeagus avec la vesica sans cornutus mais possédant à l'apex une bande longitudinale sclérifiée.

Genus description

By the habitus *Leopardellus* **gen**. **nov**. species have triangular and well-developed hindwings. The venation of the hindwings (Fig. 1) is as follows: CuA2 arising from more or less 2/3 of the cell (D/C = 0.39 to 0.55) [see Cerda, 2020], CuA1 arising just below M3, M3 arising from the lower angle of the cell, M2 arising just above M3 on the discocellular, M1 and Rs from the upper angle of the cell, no venation Sc+R1.
The genitalia (Pl. 5, Fig. 20) have a long and thin uncus; the symmetrical valvae reaching the apex of the uncus may end bicuspid. Tegumen processes at the base of the uncus are directed forward and well developed; juxta short; aedeagus with the vesica without cornutus but having a sclerotized longitudinal band at the apex.

Derivatio nominis. – « *Leopardellus* », de léopard, et du suffixe diminutif masculin « *ellus* » en référence aux motifs des ailes antérieures.

"*Leopardellus*", from leopard, and the masculine diminutive suffix "*ellus*" in reference to the patterns on the forewings.

Espèces incluses. – Deux espèces présentant tous les caractères du genre ont été transférées, *Leopardellus quadricolor* (Walker, 1855) **comb**. **nov**., et *Leopardellus dognini* (Rothschild, 1912) **comb**. **nov**. ; avec *Leopardellus formosus* (Dognin, 1905) **comb**. **nov**., le genre comprend donc trois espèces.

Two species exhibiting all the characteristics of the genus were transferred, *Leopardellus quadricolor* (Walker, 1855) **comb**. **nov**., and *Leopardellus dognini* (Rothschild, 1912) **comb**. **nov**.; with *Leopardellus formosus* (Dognin, 1905) **comb**. **nov**., the genus therefore comprises three species.

Reviewer : Michel Laguerre (*Université de Bordeaux, France*) - https://orcid.org/0000-0002-6524-7069 - https://zoobank.org/2146C3FF-355D-4649-AB4B-20BE73BDC602

This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs License, which permits use and distribution in any medium, provided the original work is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.
Copyright 2025. The Authors. *Faunitaxys* published by Lionel Delaunay on behalf of the AFCFF (Association française de Cartographie de la Faune et de la Flore).

Espèce de taille moyenne, entre 25 et 43 mm. Les ailes antérieures sont blanches, ponctuées de points ou marques, noirs ; les ailes postérieures étant d'un brun sombre. La face supérieure des abdomens rouge est ponctuée dorsalement de points noirs sur les derniers segments.

Medium-sized species, between 25 and 43 mm. The forewings are white, dotted with black spots or markings; the hindwings are dark brown. The upper surface of the abdomens is red dotted dorsally with black spots on the last segments.

Discussion. – Le genre *Leopardellus* est inventé pour retirer du genre *Eucereon* les 3 espèces citées ci-dessus.

Dans la clé des genres de la révision partielle de genres *Delphyre-Heliura-Eucereon* etc ... Cerda 2020, le genre *Leopardellus* comme pour le genre *Prosopidia* possède les nervures CuA2, CuA1 et M3 dissociées, la nervure Sc+R1 étant absente, la nervure CuA2 naissant avant les ¾ de la cellule, le tegumen étant sans transtilla, les valves ayant le sacculus fusionné à la costa, les apophyses du tegumen étant dirigées vers l'avant, la moitié basale de l'uncus étant non disjointe. *Leopardellus* se distingue de *Prosopidia* par l'absence d'écailles modifiées aux ailes antérieures, par la structure des genitalia beaucoup plus volumineuse, par les uncus non évasés à l'apex.

The genus *Leopardellus* is invented to remove the three species cited above from the genus *Eucereon*.

In the key to the genera of the partial revision of the genera *Delphyre--Heliura-Eucereon* etc... Cerda 2020, the genus *Leopardellus*, like the genus *Prosopidia*, has the CuA2, CuA1, and M3 veins dissociated, the Sc+R1 vein being absent, the CuA2 vein arising before the ¾ of the cell, the tegumen being without transtilla, the valves having the sacculus fused to the costa, the apophyses of the tegumen being directed forward, and the basal half of the uncus not disjointed. *Leopardellus* is distinguished from *Prosopidia* by the absence of modified scales on the forewings, by the much larger structure of the genitalia, and by the uncus not flared at the apex.



Figure 1. Nervation de l'aile postérieure de *Leopardellus formosus*.

• ***Leopardellus quadricolor*** (Walker, 1855) **comb**. **nov**.

(Pl. 1, Fig. 3 ; Pl. 5, Fig. 20)

Theages quadricolor Walker, 1855, List Spec. Lepid. Ins. Coll. Br. Mus. 3: 722.
- Brazil : Rio Janeiro.

Theages quadricolor; Butler, 1876, Jour. of the Linnean Soc. XII (60-62): 430.

Theages quadricolor; Druce, 1884, Insecta. Lepidoptera-Heterocera. Biologia Centrali Americana vol. I : 83.
- Panama : Volcan de Chiriqui ; Brazil.

Theages quadricolor; Kirby, 1892, Syn. Cat. Lepid. Heterocera 1: 202.
- Brazil.

Theages quadricolor; Hampson, 1898, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. 1: 495, pl. XVI, fig. 15.
- Brazil : Rio Janeiro.

Eucereum [*sic*] *quadricolor*; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 143. [Emendation erronée].
- Mexico ; Costa Rica ; Panama ; Rio Janeiro. [in part.].

Eucereon quadricolor; Hampson, 1914, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. Suppl. 1: 322.
- Venezuela : San Esteban ; Paraguay : Sapucay.

Eucereon quadricolor; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 184, pl. 24, fig. l[1].
- Brésil : Rio de Janeiro.

Eucereum [*sic*] *quadricolor*; Zikán, 1928, Entomologische Rundschau 45 (10): 39. [Emendation erronée].
- [Brésil] : Itatiaya (Südabhang bei Campo Bello).

Eucereon quadricolor; Zerny, 1931, Dtsch. Entomol. Z., Dresden, Bd. 45: 23.
- [Brésil] : Santa Catharina (Joinville, Jaraguá).

Eucereon quadricolor; Hambleton & Forbes, 1935, Arch. Ins. Biol. VI: 220.
- [Brésil] : Minas Geraes.

Eucereum [*sic*] *quadricolor*; Hoffmann, 1936, *Entomol. Rundsch*. 53(31): 448. [Emendation erronée].
- [Brésil] : Santa Catharina (Jaraguá).

Eucereon quadricolor; Biezanko, 1983, Rev. Centro de Ciências Rurais 13(4): 233.
- [Brésil] : Suest do Rio Grande Do Sul.

Eucereum [*sic*] *quadricolor*; Grados, 1997, Biod. Asse. & Monit. Ser. 1: 130. [Emendation erronée].
- Perú : Lower Urubamba (San Martin).

Eucereon quadricolor; Teston & Corseuil, 2003, Biocienscias 11(1): 84.
- Brazil : Rio Grande Do Sul.

Eucereon quadricolor; Teston & Corseuil, 2004, Rev. Bras. Ent. 48(1): 80.
- Brasil : Rio Grande Do Sul (Camaquã, Iraí).

Eucereon quadricolor; Ferro, Resende & Duarte, 2007, Biota Neotropica 7(3): 333.
- Brasil : São Paulo (Salesópolis-Boracéia).

Eucereon quadricolor; Ferro & Teston, 2009, Rev. Bras. Ent. 53(2): 284.
- Brasil : Rio Grande do Sul (Camaquã, Iraí, Morro Reuter, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, São Pedro da Serra).

Eucereon quadricolor; Ferro, Resende & Duarte, 2012, Biota Neotropica 12(4): 171.
- Brasil : Santa Catarina (Joinville, São Bento do Sul, Seara, Timbo).

Eucereon quadricolor; Silva & Silva, 2014, EntomoBrasilis 7(3): 224.
- Brazil : Santa Catarina (Blumenau).

Eucereon punctatum; Pinheiro, 2016, Zoosystema 38(1): 129, fig. 1a-e, 2a, 3a-j. [Identification erronée].
- Brazil : Espirito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo ; Venezuela : Caracas.

Eucereon quadricolor; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 113.

Eucereon quadricolor boreale Rothschild, 1912, Novitates Zoologicae 19(2): 173.
- Venezuela : San Esteban.

Eucereon quadricolor boreale; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 184.
- Vénézuéla.

Eucereon quadricolor boreale; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 113.

Eucereon quadricolor meridionale Rothschild, 1912, Novitates Zoologicae 19(2): 173.
- Paraguay : Sapucay.

Eucereon quadricolor meridionale; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 184.
- Paraguay.

Eucereon quadricolor meridionale; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 113.

Historique. – Hampson [1914] considère les sous espèces *E. quadricolor boreale*, et *E. quadricolor meridionale* Rothschild, 1912 comme des synonymes plus récents d'*E. quadricolor* (Walker, 1855).

Draudt [1916] considère *boreale*, et *meridionale* sous espèces d'*E. quadricolor* (Walker, 1855).

Pinheiro [2016] considère *E. quadricolor* (Walker, 1855), *E. quadricolor boreale* et *E. quadricolor meridionale* Rothschild, 1912, comme des synonymes plus récents d'*Eucereon punctatum* (Guérin-Méneville, [1844].

Cerda [2020] considère *E. quadricolor* (Walker, 1855) en tant que *bona species* et confirme *E. quadricolor boreale*, et *E. quadricolor meridionale* Rothschild, 1912 comme des synonymes plus récents d'*E. quadricolor* (Walker, 1855).

Hampson [1914] considers the subspecies *E. quadricolor boreale*, and *E. quadricolor meridionale* Rothschild, 1912 as junior synonyms of *E. quadricolor* (Walker, 1855).



Planche. **1**. Habitus (recto-verso).

1. *P. lemoulti* ♂. **2**. *P. leucoprocta* ♂. **3**. *L. quadricolor* ♂. **4**. *P. fusiformis* ♂. **5**. *P. leucosticta* ♂.

Draudt [1916] considers *boreale*, and *meridionale* as subspecies of *E. quadricolor* (Walker, 1855).
Pinheiro [2016] considers *E. quadricolor* (Walker, 1855), *E. quadricolor boreale* and *E. quadricolor meridionale* Rothschild, 1912, as junior synonyms of *Eucereon punctatum* (Guérin-Méneville, [1844].
Cerda [2020] considers *E. quadricolor* (Walker, 1855) as a bona species and confirms *E. quadricolor boreale*, and *E. quadricolor meridionale* Rothschild, 1912 as junior synonyms of *E. quadricolor* (Walker, 1855).

Notes. – *Theages quadricolor* n'est pas congénérique d'*Eucereon*, cette espèce possèdant tous les caractères du genre *Leopardellus*, nous l'avons donc transféré dans ce genre ; *Leopardellus quadricolor* **comb**. **nov**.
Theages quadricolor; Druce, vol.2 1891-1900 [1897] et *Theages quadricolor sub.1*; Hampson, 1898 = *Leopardellus formosus* (Dognin, 1905).
Les localités Mexico et Costa Rica sont erronées, il s'agit d'*E. formosa* ; celle du Panama est douteuse et devra être confirmée.
Un spécimen du Brésil (Santa Catarina), un du Paraguay et un de Guyane ont été disséqués, les spécimens du Paraguay et de Guyane ont des genitalia identiques, ceux du Santa Catarina paraissent légèrement différents, il est peut être possible d'être en présence de 2 espèces. Malheureusement aucun spécimen du Venezuela ni du Pérou ni de Bolivie n'a été disséqué.
Trois spécimens, deux d'Argentine et un du Brésil (Santa Catarina) ont été séquencés [BOLD:ABW9434], malheureusement aucun spécimen de Guyane ni du Paraguay ne l'ont été. Il nous est impossible pour le moment de statuer sur la conspécificité ou non des spécimens des différentes zones géographiques et les laissons donc sous le même taxon.
Photo de l'holotype de *Theages quadricolor* (NHM) examinée.

Theages quadricolor is not congeneric with *Eucereon*, this species possessing all the characteristics of the genus *Leopardellus*, so we have transferred it to this genus; *Leopardellus quadricolor* **comb**. **nov**.
Theages quadricolor; Druce, vol.2 1891-1900 [1897] and *Theages quadricolor* sub.1; Hampson, 1898 = *Leopardellus formosus* (Dognin, 1905).
The localities Mexico; Costa Rica are erroneous, it is *E. formosa*; that of Panama is doubtful and will need to be confirmed.
One specimen of Santa Catarina from Brazil, one from Paraguay, and one from French Guiana were dissected. The Paraguayan and French Guiana specimens have identical genitalia, while those from Santa Catarina appear slightly different, suggesting the possibility of two species. Unfortunately, no specimens from Venezuela, Peru or Bolivia could be dissected.
Three specimens, two from Argentina and one from Brazil (Santa Catarina), were sequenced [BOLD:ABW9434]. Unfortunately, no specimens from French Guiana or Paraguay were sequenced. At this time, we cannot determine whether the specimens from the different geographic areas are conspecific, and we therefore classify them under the same taxon.
A photograph of the holotype of *Theages quadricolor* (NHM) has been examined.

Nouveau pour la Guyane.
Espèce capturée au piège lumineux. Species caught at light trap.

Matériel examiné. – 10 spécimens (coll. JAC, ML).

Guyane française
Zone sinnamary : route de Petit Saut (pk.19).
- Décembre.

Pérou
- Junin (Satipo), août.

Bolivie
- La Paz (rte Camata-Apollo 1400 m), décembre.
- La Paz (rte Chulumani-Inquisivi, 1150 m), octobre.

Paraguay
- Alto Parana (Itabo), Octobre.
- Cordilliera (Tacuara Renda & Puerto Olivares), juillet-août.
- Kanindeyu (Agr. Armiticio), août

Brésil
- Sao Paulo (Apiai), janvier, juin.
- Sta Catarina (rio Vermelho), octobre.

Prosopidia Brik, 1953
Espèce type : ***Prosopidia atypica*** Bryk, 1953.

• ***Prosopidia lemoulti*** (Schaus, 1905)
(Pl. 1, Fig. 1 ; Pl. 3, Fig. 11)

Eucereon lemoulti Schaus, 1905, Proc. of the U. S. Nat. Museum 24: 192.
- St. Laurent, Maroni River, French Guiana.

Eucereum lemoulti; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 140. [Emendation erronée].
- Franz-Guayana.

Hyaleucerea lemoulti; Hampson, 1914, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. Suppl. 1: 382, pl. XXII, fig. 29.
- Dutch Guiana : Surinam ; Fr. Guiana.

Hyaleucerea lemoulti; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 205, pl. 26, fig. b[6, sous *lugubris*].
- Guyane française : Maroni.

Hyaleucerea lemoulti; Zerny, 1931, Ann. Naturh. Mus. Wien, Bd. 45: 263.
- Pará : Taperinha [août] ; Holl.- und Franz.-Guyana.

Hyaleucerea lemoulti; Hagmann, 1938, Liv. Jubilar. Prof. Travassos, Rio Janeiro: 194.
- [Brazil] : Pará ; Guyanas ; Venezuela : Rio Caura e Ilha Trinidade. [In part.].

Hyaleucerea lemoulti; Rego Barros & Machado, 1971, Arq. do Mus. Nac. 54: 171.

Hyaleucerea lemoulti; Betz, 1980, Bull. Soc. Entomol. Fr. (85): 92.
- Guyane française : Maripasoula (novembre-décembre).

Hyaleucerea lemoulti; Teston & al., 2019, Biota Neotrop. 19(2): 9.
- Brazil : Pará (Altamira-Monte Santo, Belterra-National Forest of Tapajós, Santarem-Taperinha).

Prosopidia lemoulti; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 38-40, fig. 19 ; pl. 6, fig. 44 & 48a-d.
- Guyane.

Notes. – Photo de l'holotype d'*Eucereon lemoulti* (USNM) examinée.
A photograph of the holotype of *Eucereon lemoulti* (USNM) has been examined.

Espèce capturée au piège lumineux au piège Malaise. Species caught at light trap and by Malaise trap.

Matériel examiné. – 30 spécimens (coll. JAC, PC, TR, BF, BH, ML, OL, SF).

Guyane française
Zone Camopi : Dégrad Laurens ;
Zone Oyapock : Approuague (saut Mapaou) ;
Zone Montsinéry : Galion ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, Camp Caïman, route de Kaw (pk.16, 38 & 41) ;
Zone Coralie-Cacao : camp Changement, pistes forestières;
Zone Bélizon : piste forestière (pk.27), N2 (pk.79), piste forestière de camp Hervo ;
Zone Mtgne Trinité : Mont Tabulaire ;
Zone Bas-Maroni : piste Crique Serpent, route d'Apatou (pk.15), Moutouchi ;
Zone massif Dékou Dékou : Boeuf Mort ;
Zone Centrale : Saül (bourg & environs,), crique Limonade (DZ4).
- De septembre à juillet.

Bolivie : Pr. La Paz : rte Camata-Apollo 1400 m, décembre.

• ***Prosopidia leucoprocta*** (Dognin, 1909)
(Pl. 1, Fig. 2 ; Pl. 3, Fig. 12)

Hyaleucerea leucoprocta Dognin, 1909, Ann. Soc. Entomol. de Belg.: 217.
- Guyane française : Saint-Laurent du Maroni.

Hyaleucerea leucoprocta; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 153.
- Franz-Guayana.

Hyaleucerea leucoprocta; Hampson, 1914, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. Suppl. 1: 382, pl. XXII, fig. 27.
- Fr. Guiana : St. Laurent du Maroni.



Planche. **2**. Habitus (recto-verso).

6. *V. discalis* ♂. **7**. *V. hampsoni hampsoni* ♂. **8**. *B. lucis* ♂. **9**. *A. nathalan* ♂. **10**. *A. pauloi* ♂.

Hyaleucerea leucoprocta; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 205, pl. 26, fig. b[5].
- Guyane française.

Hyaleucerea leucoprocta; Rego Barros & Machado, 1971, Arq. do Mus. Nac. 54: 171.

Hyaleucerea leucoprocta; Betz, 1974, Bull. Soc. Entomol. Fr. (79): 41.
- Guyane française : Saül (avril).

Hyaleucerea leucoprocta; Grados, 2001, Rev. Peru. Entomol. 42: 66.
- Perú : región del Bajo, Río Urububamba, Cuzco (San Martin 475 m, Cashiriari 590 m).

Prosopidia leucoprocta; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 38-41, fig. 19 ; pl. 6, fig. 43 & 47a-d.
- Guyane.

Notes. – Photo de l'holotype de *Hyaleucerea leucoprocta* (USNM) examinée.

A photograph of the holotype of *Hyaleucerea leucoprocta* (USNM) has been examined.

Espèce capturée au piège lumineux, au piège Malaise, à vue et aux pyrrolizidines.

Species caught at light trap, by Malaise trap, in flight and with pyrrolizidine baits.

Matériel examiné. – 55 spécimens (coll. JAC, PC, TR, BF, BH, TT, ML, OL, SF).

Guyane française
Zone Camopi : Dégrad Laurens ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, route de Kaw (pk. 38 & 39) ;
Zone Coralie-Cacao : N2 (pk.41), camp Changement, pistes forestières, Carbets de Coralie ;
Zone Bélizon : Montagne Tortue (450 m), N2 (pk.79), piste forestière ;
Zone Nouragues-Arataï : inselberg ;
Zone Kourou : dégrad Saramaka ;
Zone Sinnamary : Malmanoury ;
Zone Mtgne Trinité : Bénitier , DZ (636 m), Courcibo ;
Zone Bas-Maroni village Espérance, route d'Apatou (forêt crique Bastien) ;
Zone Grand Santi : Grand Santi ;
Zone Centrale : Saül (bourg, aérodrome et environs, Mt. Galbao), sud (3°28'23"N- 53°13'54"W) ;
Zone Haut-Maroni : Papaïchton (crique Bellevue) ;
Zone Tumuc Humac : Mitaraka sud & borne 1.

- Toute l'année.

Venezuela : Bolivar : Auyan Tepui, Guayaraca-El Danto 1400 m, janvier.

Bolivie : Pr. La Paz : rte Camata-Apollo 1400 m, décembre.

Bipartes **gen**. **nov**.

ZooBank : https://zoobank.org/839BD198-3EC1-4F52-B681-7727D3F11C37

Espèce type : *Acridopsis lucis* Butler, 1878.

Description du genre

Par l'habitus les espèces de *Bipartes* **gen**. **nov**. ont les ailes postérieures bien développées et de forme triangulaire. La nervation des ailes postérieures (Fig. 2) se présente comme suit : CuA2 naissant des 4/5ème de la cellule (D/C = 0,25) [voir Cerda, 2020], CuA1 et M3 ayant une longue tige commune naissant de l'angle inférieur de la cellule, M2 naissant bien au dessus sur la discocellulaire ; M1 et Rs naissant de l'angle supérieur de la cellule, SC+R1 étant bien développé.
Les genitalia (Pl. 5, Fig. 19) ont les valves symétriques et moyennement développées, le sacculus ayant une pilosité éparse, se sépare de la costa de la moitié basale. Le tegumen à la base de l'uncus possède deux grandes apophyses dépassant l'uncus ; il possède aussi à la base des valves deux petites transtilla digitiformes. L'uncus, long et fin, se termine en forme de crochet. Juxta peu développée, de forme ovoïde ou triangulaire. Aedeagus droit ; vesica de taille modérée avec de petits cornuti.
Dans la clé de la révision des genres *Delphyre-Heliura-Eucereon* etc... [Cerda, 2020] les espèces du genre *Bipartes* comme pour celles du genre *Apoheliura* Cerda, 2020, ont aux ailes postérieures CuA1et M3 avec une tige commune naissant de l'angle inférieure de la cellule, la nervure Sc+R1étant présente, et CuA2 naissant des 4/5ème de la cellule. Les genitalia ont le tegumen avec une transtilla digitiforme, et les valves ont le sacculus se séparant de la moitié basale. Le genre *Bipartes* **gen**. **nov**. se sépare du genre *Apoheliura* par les grandes apophyses du tegumen à la base de l'uncus et par l'absence de grands cornuti sur la vesica.

Genus description

By the habitus, *Bipartes* **gen**. **nov**. species have well-developed, triangular-shaped hindwings. The venation of the hindwings (Fig. 2) is as follows: CuA2 arises from 4/5 of the cell (D/C = 0.25) [see Cerda, 2020], CuA1 and M3 have a long common stalk arising from the lower angle of the cell, M2 arises well above on the discocellular; M1 and Rs arise from the upper angle of the cell, SC+R1 being well developed.
The genitalia (Pl. 5, Fig. 19) have symmetrical and moderately developed valvae, the sacculus having sparse pilosity, separates from the costa of the basal half. The tegumen at the base of the uncus has two large processes extending beyond the uncus; it also has two small, finger-like transtilla at the base of the valvae. The uncus, long and thin, ends in a hook shape. Juxta is poorly developed, ovoid or triangular in shape. Aedeagus is straight; vesica is moderately sized with small cornuti.
In the key of the revision of the genera *Delphyre-Heliura-Eucereon* etc... [Cerda, 2020] the species of the genus *Bipartes*, as for those of the genus *Apoheliura* Cerda, 2020, have CuA1 and M3 in the hindwings with a common stalk arising from the lower angle of the cell, the vein Sc+R1 being present, and CuA2 arising from 4/5 of the cell. The genitalia have the tegumen with a finger-like transtilla, and the valvae have the sacculus separating from the basal half. The genus *Bipartes* **gen**. **nov**. separates from the genus *Apoheliura* by the large processes of the tegumen at the base of the uncus and by the absence of large cornuti on the vesica.

Derivatio nominis. – « *Bipartes* » « deux parties » substantif féminin, en référence à la grosse tache circulaire à la base des ailes antérieures.

"*Bipartes*" "two parts" feminine noun, in reference to the large circular spot at the base of the forewings.

Espèces incluses. – *Bipartes peruana* (Pinheiro & Duarte, 2016) **comb**. **nov**., présentant tous les caractères du genre a été tranféré, avec *Bipartes lucis* (Butler, 1878) **stat**. **rev**., **comb**. **nov**., le genre comprend donc deux espèces.

Bipartes peruana (Pinheiro & Duarte, 2016) **comb**. **nov**., exhibiting all the characteristics of the genus, has been transferred, with *Bipartes lucis* (Butler, 1878) **stat**. **rev**., **comb**. **nov**., the genus therefore comprises two species.



Figure 2 : nervation de l'aile postérieure de *Bipartes lucis*.

• ***Bipartes lucis*** (Butler, 1878) **stat**. **rev**., **comb**. **nov**.
(Pl. 2, Fig. 8 ; Pl. 5, Fig. 19)

Acridopsis lucis Butler, 1878, Trans. Entomol. Soc. I: 45.
- [Brésil] : Amazons (Rio Jutahi).

Acridopsis lucis; Kirby, 1892, Syn. Cat. Lepid. Heterocera 1: 165.
- [Brésil] : Amazons.



Planche. **3**. Genitalia ♂.

a. Vue de face. **b**. Vue de dos. **c**. Vue latérale gauche. **d**. Aedeagus.
11. *P. lemoulti* Guyane. **12**. *P. leucoprocta* Guyane. **13**. *P. fusiformis* Guyane. **14**. *P. leucosticta* Guyane

Historique. – Hampson [1898] considère *Acridopsis lucis* Butler, 1878 comme un synonyme plus récent d'*Heliura pierus* (Stoll, 1781).

Hampson [1898] considers *Acridopsis lucis* Butler, 1878 as a junior synonym of *Heliura pierus* (Stoll, 1781).

Notes. – Nous avons considéré *A. lucis* en tant que *bona species*. Le dessin de Stoll étant très rudimentaire, nous ne savons pas exactement à quoi correspond *H. pierus*, mais de notre avis, cette espèce est très proche voir identique à *Kohllius pusillus* (Butler, 1878).
Photo de l'holotype d'*Acridopsis lucis* (NHM) examinée.

We considered *A. lucis* as a bona species. Since Stoll's drawing is very rudimentary, we do not know exactly what *H. pierus* corresponds to, but in our opinion, this species is very close or even similar to *Kohllius pusillus* (Butler, 1878).
A photograph of the holotype of *Acridopsis lucis* (NHM) has been examined.

Nouveau pour la Guyane.
Espèce capturée au piège lumineux. Species caught at light trap.

Matériel examiné. – 11 spécimens (coll. JAC, ML, SF).

Guyane française
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, rte de Kaw (pk.37 & 38), Camp Caïman ;
Zone Bélizon : pistes forestières ;
Zone Iracoubo : piste Patagaï ;
Zone Grand Santi : Grand Santi .

- De juin à novembre, janvier-février, mars.

Apoheliura Cerda, 2020

Espèce type : *Heliura nathalan* Schaus, 1924.

• ***Apoheliura nathalan*** (Schaus, 1924)

(Pl. 2, Fig. 9 ; Pl. 4, Fig. 17)

Heliura nathalan Schaus, 1924, Proc. U.S. Nat. Museum 65(7): 15.
- British Guyana : rio Potaro

Apoheliura nathalan; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 81-82, fig. 41 ; pl. 15, fig. 115 & 119a-e.
- Guyane.

Notes. – Photo de l'holotype d'*Heliura nathalan* (USNM) examinée.

A photograph of the holotype of *Heliura nathalan* (USNM) has been examined.

Espèce capturée au piège lumineux.
Species caught at light trap.

Matériel examiné. – 34 spécimens (coll. JAC, BH, TT, ML, OL, SF).

Guyane française
Zone Oyapock : St. Georges (Bourg), N2 (pk.15) ;
Zone Mtgne de Kaw : route de Kaw (pk.11, 15, 29, 32 & 38) ;
Zone Coralie-Cacao : pistes forestières ;
Zone Nouragues-Arataï : inselberg, Mont Chauve ;
Zone Île de Cayenne : savane Cavalet ;
Zone Sinnamary : Malmanoury, Pointe Combi ;
Zone Iracoubo : piste Patagaï (pk.10), piste de la Montagne de Fer ;
Zone Mtgne Trinité : Bénitier ;
Zone Bas-Maroni : piste du Plateau des Mines, piste Crique Serpent, crique Awara, route d'Apatou (pk.17 & 25,5), Moutouchi ;
Zone Grand Santi : Grand Santi ;
Zone Centrale : haute Mana (saut Ananas).

- Octobre-novembre, de janvier à juin.

Bolivie : Pr. La Paz : Incas Huara 1500 m, mars.

• ***Apoheliura pauloi*** (Pinheiro & Duarte, 2016)

(Pl. 2, Fig. 10 ; Pl. 4 Fig. 18)

Heliura pauloi Pinheiro & Duarte, 2016, Canadian Entomol. 148: 407, fig. 5 & 37-40.
- Peru : Pasco (Pan de Azúcar) ; Guyana : Rio Potaro (Tumatumari).

Apoheliura pauloi; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n °9 : 81-82, fig. 41 ; pl. 15, fig. 116 & 120a-e.
- Guyane.

Espèce capturée au piège lumineux.
Species caught at light trap.

Matériel examiné. – 5 spécimens (coll. ML, SF).

Guyane française
Zone Nouragues-Arataï : Mont Chauve ;
Zone Mtgne de Kaw : route de Kaw (pk.37 & 38).
Zone Centrale : Saül (Mont Galbao).

- Décembre-janvier, juillet-août.

Passineura Butler, 1876

Espèce type : *Pampa fusiformis* Walker, 1856.

• ***Passineura fusiformis*** (Walker, 1856).

(Pl.1, Fig. 4 ; Pl. 3, Fig. 13)

Pampa fusiformis Walker, 1856, List Spec. Lepid. Ins. Coll. Br. Mus. 7: 1629.
- [Brazil] : Valley of the Amazon.

Passineura fusiformis; Butler, 1876, Butler, 1876, Jour. of the Linnean Soc. XII (60-62): 413, pl.29, fig. 4.
- [Brazil] : Tapajos.

Passineura fusiformis; Kirby, 1892, Syn. Cat. Lepid. Heterocera 1: 158.
- [Brazil] : Amazons.

Pampa fusiformis; Schaus, 1896, Proc. of the Zool. Soc. of London: 636.

Hyaleucerea fusiformis; Hampson, 1898, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. 1: 535, fig. 284.
- [Brazil] : Amazon (Rio Purus and Solimoës).

Hyaleucerea fusiformis; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 152.
- [Brazil] : Amazonas

Hyaleucerea fusiformis; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 204, pl. 26, fig. b[4].
- Guyane française ; Amazonie.

Hyaleucerea fusiformis; Zerny, 1931, Ann. Naturh. Mus. Wien, Bd. 45: 263.
- [Brazil] : Pará (Taperinha [mars, de juillet à octobre, décembre]), Amazonas (Rio Purus-Jurucuá) ; Franz.-Guyana.

Hyaleucerea fusiformis; Hagmann, 1938, Liv. Jubilar. Prof. Travassos, Rio Janeiro: 194.
- [Brazil] : Pará, Alto Amazonas; Bolivie ; Perú ; Equador e Colombia ; Guyanas ; Venezuela : Rio Caura e Ilha Trinidade. [In part.].

Hyaleucerea fusiformis; Forbes, 1939, Bull. Mus. Comp. Zoöl. 85(4): 162.
- Panama : Barro Colorado Island ; ranges to the Amazons.

Hyaleucerea fusiformis; Fleming, 1950, Zoologica 35(3): 213.
- British Guyana : Kartabo ; French Guiana to the Amazons. [In part.].

Hyaleucerea fusiformis; Blest, 1964, Zoologica 49(3): 167.
- [Panama] : Barro Colorado.

Hyaleucerea fusiformis; Rego Barros & Machado, 1971, Arq. do Mus. Nac. 54: 171.

Hyaleucerea fusiformis; Betz, 1974, Bull. Soc. Entomol. Fr. (79): 41.
- Guyane française : Saül (avril) ; Amazonie.

Hyaleucerea fusiformis; Field, 1975, Smith. Contr. to Zoology 198 : 8.

Hyaleucerea fusiformis; Grados, 1999, Rev. Peru. Entomol. 41: 13.
- Perú : Zona Reservada Tambopata-Candamo, Madre de Dios.

Hyaleucerea fusiformis; Grados, 2001, Rev. Peru. Entomol. 42: 66.
- Perú : región del Bajo, Río Urububamba, Cuzco (Segakiato 280 m, Las Malvinas 380-480 m, San Martin 475 m).

Hyaleucerea fusiformis; Teston & Correa, 2015, Check List 11(2): 4.
- Brasil : Pará (Serra do Pardo National Park).

Hyaleucerea fusiformis; Teston & al., 2019, Biota Neotrop. 19(2): 11.
- Brazil : Amazon (Valley of Amazonas [river], São Gabriel [da Cachoeira]-Taracúa) ; Pará (Belterra-National Forest of Tapajós, Santarem-Taperinha, São Félix do Xingu-Serra do Pardo National Park).



Planche. **4**. Genitalia ♂.

a. Vue de face. **b**. Vue de dos. **c**. Vue latérale gauche. **d**. Vue latérale droite. **e**. Aedeagus.
15. *V. discalis* Guyane. **16**. *V. hampsoni hampsoni* Guyane. **17**. *A. nathalan* Guyane. **18**. *A. pauloi* Guyane.

Passineura fusiformis; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 35-38, fig.18 ; pl.6, fig.41 & 45a-e.
- Guyane.

Scepsis trifasciata Butler, 1877, Illus. Typ. Speci. In the Coll. Brit. Mus.: 49, pl.16, fig.11
- [Brazil] : Rio Purus-Jurucua.

Scepsis trifasciata; Kirby, 1892, Syn. Cat. Lepid. Heterocera 1: 175.
- [Brazil] : Rio Purus.

Hyaleucerea trifasciata; Rego Barros & Machado, 1971, Arq. do Mus. Nac. 54: 171.

Hyaleucerea trifasciata; Teston & al., 2019, Biota Neotrop. 19(2): 12.
- Brazil : Amazon (Rio Purus-Jurucuá, Solimões [river]).

Historique. – Schaus [1896] considère *Scepsis trifasciata* Butler, 1877 comme un synonyme plus récent de *Pampa fusiformis* Walker, 1856. Rego Barros & Machado [1971] et Teston & al. [2019] considèrent *Scepsis trifasciata* en tant que *bona species*.

Schaus [1896] considers *Scepsis trifasciata* Butler, 1877 as a more recent synonym of *Pampa fusiformis* Walker, 1856.
Rego Barros & Machado [1971] and Teston et al. [2019] consider *Scepsis trifasciata* as a *bona species*.

Notes. – Excepté les bandes abdominales blanches dues à un abdomen distendu, aucun caractère déterminant n'apparaît ni dans les descriptions originales ni dans l'étude de ces deux holotypes. Les deux holotypes provenant de la même région géographique, nous considérons de nouveau *Passineura trifasciata* (Butler, 1877) **comb. nov**., **stat**. **rev**., **syn**. **conf**. en tant que synonyme plus récent de *Passineura fusiformis* (Walker, 1856).
Dans BOLD, quatre spécimens, deux de Guyane, un du Pérou (sous *Hyaleucera fusiformis*) et un du Panama (sous *Passineura sp.*) ont été séquencés. Les spécimens de Guyane et du Pérou ont le même BIN [AAN6892], le spécimen du Panama a un BIN différent [ADT7184], les spécimens du Panama sont donc une autre espèce et sont pour le moment indéterminés. La localité Panama doit être supprimé pour ce taxon.
Les références de *Hyaleucerea fusiformis*; Forbes, 1939 & *Hyaleucerea fusiformis*; Blest, 1964 ont donc été supprimées.
Photos des holotypes de *Pampa fusiformis* (OX) et de *Scepsis trifasciata* (NHM) examinées.

Except for the white abdominal bands due to a distended abdomen, no deciding characters appear in the original descriptions or in the study of these two holotypes. Since both holotypes come from the same geographical region, we again consider *Passineura trifasciata* (Butler, 1877) **comb**. **nov**., **stat**. **rev**., **syn**. **conf**. as a junior synonym of *Passineura fusiformis* (Walker, 1856).
In BOLD, four specimens were sequenced: two from French Guiana, one from Peru (as *Hyaleucera fusiformis*), and one from Panama (as *Passineura sp.*). The French Guiana and Peruvian specimens have the same BIN number [AAN6892], while the Panama specimen has a different BIN number [ADT7184]. Therefore, the Panama specimens are a different species and are currently undetermined. The Panama locality should be removed for this taxon. The references for *Hyaleucerea fusiformis*; Forbes, 1939 & *Hyaleucerea fusiformis*; Blest, 1964 have thus been removed.
Photographs of the holotypes of *Pampa fusiformis* (OX) and of *Scepsis trifasciata* (NHM) have been examined.

Espèce capturée au piège lumineux et aux pyrrolizidines.

Species caught at light trap and with pyrrolizidine baits.

Matériel examiné. – 40 spécimens (coll. JAC, PC, TR, BF, BH, TT, ML, OL, SF).

Guyane française

Zone Oyapock : N2 (pk.7), Approuague (saut Mapaou) ;
Zone Montsinéry : Mtgne des Chevaux ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, route de Kaw (pk.28 & 38) ;
Zone Coralie-Cacao : Carbet Coralie (parking d'altitude), camp Changement ;
Zone Nouragues-Arataï : inselberg ;
Zone Sinnamary : rte de Petit Saut (pk.19), Pointe Combi ;
Zone Mtgne Trinité : Bénitier ;
Zone Bas-Maroni : D11 (pk.7,5), village Espérance, piste du plateau des Mines, village société, route d'Apatou (pk.25,5) ;
Zone Centrale : Saül (bourg et environs), Mt. Galbao, sud (3°28'23"N-53°13'54"W) ;
Zone Haut-Maroni : Papaïchton, Antecume Pata, Kayodé.

- D'août à juin.

• ***Passineura leucosticta*** (Druce, 1905).

(Pl. 1, Fig. 5 ; Pl. 3, Fig. 14)

Hyaleucerea leucosticta Druce, 1905, Mag. Nat. Hist. (7)XV : 466.
- Venezuela : Caura Valley (Corosita).

Hyaleucerea leucosticta; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 153.
- Venezuela.

Hyaleucerea leucosticta; Hampson, 1914, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. Suppl. 1: 380, fig. 53.
- Venezuela : Caura Valley.

Hyaleucerea leucosticta; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 205, pl. 26, fig. c[2].
- Vénézuéla ; Guyane française.

Hyaleucerea leucosticta; Zerny, 1931, Ann. Naturh. Mus. Wien, Bd. 45: 263.
- [Brazil] : Pará (Taperinha [juillet-août, octobre-novembre, janvier-février]); Venezuela : Caura-Tal ; Franz.-Guyana.

Hyaleucerea leucosticta; Hagmann, 1938, Liv. Jubilar. Prof. Travassos, Rio Janeiro: 194.
- [Brazil] : Pará ; Guyanas ; Venezuela : Rio Caura e Ilha Trinidade. [In part.].

Hyaleucerea leucosticta; Rego Barros & Machado, 1971, Arq. do Mus. Nac. 54: 171.

Hyaleucerea leucosticta; Betz, 1972, Bull. Soc. Entomol. Fr. 8(2): 407.
- Venezuela ; Guyane française : Saül (janvier).

Hyaleucerea leucosticta; Betz, 1980, Bull. Soc. Entomol. Fr. (85): 92.
- Brésil : Moyen Xingu (Sao Felix, septembre-octobre).

Hyaleucerea leucosticta; 2001, Rev. Peru. Entomol. 42: 66.
- Perú : región del Bajo, Río Urububamba, Cuzco (Las Malvina 380-480 m, Cashiriari 590 m).

Hyaleucerea leucosticta; Teston & Correa, 2015, Check List 11(2): 4.
- Brasil : Pará (Serra do Pardo National Park).

Hyaleucerea leucosticta; Teston & al., 2019, Biota Neotrop. 19(2): 9.
- Brazil : Pará (Belterra-National Forest of Tapajós, Santarem-Taperinha, São Félix do Xingu-Serra do Pardo National Park).

Passineura leucosticta; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 35-38, fig.18 ; pl.6, fig.42 & 46a-d.
- Guyane.

Notes. – Cinq spécimens on été séquencés, quatre de Guyane et un du Pérou. Un problème se pose avec l'identification des spécimens de *P. leucosticta*, car dans BOLD les spécimens de Guyane apparaissent sous deux BIN [AAN7025 & ADZ5666], celui du Pérou sous [ADZ5666]. Ne sachant pas à lequel des deux BINs pourrait correspondre l'holotype, toutes les citations et localités de *leucosticta* sont douteuses.
Photo de l'holotype de *Hyaleucerea leucosticta* (NHM) examinée.

Five specimens were sequenced, four from French Guiana and one from Peru. A problem arises with the identification of *P. leucosticta* specimens, because in BOLD the specimens from French Guiana appear under two BINs [AAN7025 & ADZ5666], that of Peru under [ADZ5666]. Not knowing which of the two BINs could correspond to the holotype, all citations and localities of *leucosticta* are doubtful.
Photograph of the holotypes of *Hyaleucerea leucosticta* (NHM) has been examined.

Espèce capturée au piège lumineux, sur fleurs, au piège Malaise et aux pyrrolizidines.

Species caught at light trap, on flowers, by Malaise trap and with pyrrolizidine baits.

Matériel examiné. – 43 spécimens (coll. JAC, PC, TR, TT, ML, OL, SF).

Guyane française

Zone Oyapock : St. Georges (Bourg), N2 (pk.7, pk.24 & 128[61]), Approuague (saut Mapaou) ;



Planche. **5**. Genitalia ♂.

a. Vue de face. b. Vue de dos. **c**. Vue latérale gauche. **d**. Aedeagus.
19. *B. lucis* Guyane. **20**. *L. quadricolor* Guyane.

Zone Nouragues-Arataï : inselberg ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, Camp Caïman, route de Kaw (pk.3,5, 6,5, 16, 28, 37 & 45) ;
Zone Coralie-Cacao : pistes forestières, Carbet Coralie (parking d'altitude), camp Changement, dégrad Corrèze (scierie) ;
Zone Bélizon : pistes forestières ;
Zone Sinnamary : route de Petit Saut (pk.19), Pointe Combi ;
Zone Bas-Maroni : D11 (pk.7,5), village Espérance, Moutouchi ;
Zone massif Dékou Dékou : Boeuf Mort ;
Zone Centrale : Saül (environs, Mt. La Fumée) ;
Zone Haut-Maroni : Antecume Pata.

- De septembre à juin.

Venezuela : Bolivar : route Santa Helena-Icaburu 700 m, novembre.

Veraneacerea Cerda, 2020

Espèce type : *Aclytia rufiventris* Schaus, 1894.

• ***Veraneacerea discalis*** (Druce, 1905)

(Pl. 2, Fig. 6 ; Pl. 4, Fig. 15)

Neacerea discalis Druce, 1905, Mag. Nat. Hist. (7)XV : 463.
- Venezuela : Caura Valley (Corosita).

Delphyre discalis; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 135.
- Venezuela.

Delphyre discalis; Hampson, 1914, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. Suppl. 1: 301, pl. XVII, fig. 11.
- Venezuela : Caura Valley.

Delphyre discalis; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 176, pl. 29, fig. m[2].
- Vénézuéla.

Delphyre discalis; Zerny, 1931, Ann. Naturh. Mus. Wien, Bd. 45: 256.
- [Brazil] : Pará (Taperinha [mars, mai, -août, de juillet à octobre]) ; Venezuela : Caura-Tal, San Esteban ; Franz.-Guyana.

Delphyre discalis; Hagmann, 1938, Liv. Jubilar. Prof. Travassos, Rio Janeiro: 194.
- [Brazil] : Pará ; Guyanas ; Venezuela : Rio Caura e Ilha Trinidade. [In part.].

Delphyre discalis; Fleming, 1959, Zoologica 44(3): 96, pl. 2, fig. 28.
- Trinidad ; Venezuela ; French Guiana.

Delphyre discalis; Korytkowski & al., 1970, Cat. del Mus. de Entomol. 1(3): 22.
- [Pérou] : Lambayeque (Monsefú).

Delphyre discalis; Ferro & Diniz, 2007, Rev. Bras. de Zoologia 24(3): 642.
- [Brazil] : São Paulo (Assis, Luis Antônio, Porto Ferrera, Santa Rita do Passa Quarto, São Simão), Goias (Caldas Novas).

Delphyre discalis; Teston & al., 2012, Acta Amazonica 42(1): 108.
- Brazil : Pará (Altamira).

Delphyre discalis; Delphina & Teston, 2013, Acta Amazonica 43(1): 84.
- Brazil : Pará (Altamira).

Delphyre discalis; Teston & Correa, 2015, Check List 11(2): 4.
- Brasil : Pará (Serra do Pardo National Park).

Delphyre discalis; Teston & al., 2019, Biota Neotrop. 19(2): 6.
- Brazil : Mato Grosso (Sinop) ; Pará (Altamira, Santarem-Taperinha, São Félix do Xingu- Serra do Pardo National Park) ; Rondonia (Cacaulândia).

Veraneacerea discalis; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 42-46, fig. 21 ; pl. 8, fig. 60& 64a-d.
- Guyane.

Delphyre infra-alba Rothschild, 1912, Novitataes Zoologicae 19(2): 166.

Historique. – Hampson [1914] considère *Delphyre infra-alba* comme un synonyme plus récent de *Neacerea discalis*.

Hampson [1914] considers *Delphyre infra-alba* as a junior synonym of *Neacerea discalis*.

Notes. – Photos des holotypes de *Delphyre discalis* & *Delphyre infra-alba* (NHM) examinées.

Photographs of the holotypes of *Delphyre discalis* & *Delphyre infra-alba* (NHM) have been examined.

Espèce capturée au piège lumineux.

Species caught at light trap.

Matériel examiné. – 20 spécimens (coll. JAC, ML, OL, SF).

Guyane française

Zone Oyapock : Approuague (saut Mapaou) ;
Zone Ouanary : Mtgne Bruyère ;
Zone Montsinéry : N1 pk.15 ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa ;
Zone Ile de Cayenne : Cayenne, Rorota, La Levée ;
Zone Sinnamary : Pointe Combi ;
Zone Iracoubo : savane Trou Poissons.

- Mai-juin, de septembre à novembre.

Trinidad : N. Range Forest 600 m, mai.

Venezuela : Bolivar : El Dorado, août.

Bolivie : Pr. La Paz :
- Rte Caranavi-Coroico, novembre.
- Rte Chulumani-Inquisivi, octobre ;
- Rte Caranavi-Yucumo, novembre.

• ***Veraneacerea hampsoni hampsoni*** (Rothschild, 1912)

(Pl. 2, Fig. 7 ; Pl. 4, Fig. 16)

Delphire [***sic***] rufiventris *hampsoni* Rothschild, 1912, Novitates Zoologicae 19(2): 165. [emmendation erronée].
- Pérou : Carabaya (Santo Domingo).

Delphyre hampsoni hampsoni; Hampson, 1914, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. Suppl. 1: 301, pl. XVII, fig. 10.
- Pérou : Carabaya (Santo Domingo).

Delphyre hampsoni hampsoni; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 176, pl. 30, fig. a[4].
- Pérou.

Delphyre hampsoni; Piñas & Manzano, 2003, Mariposas del Ecuador vol. 21b : 33, fig. 180-182.
- Ecuador : Oriente-Orellana (Yasuni 350 m), Oriente-Napo (San Rafael 1550 m).

Delphyre hampsoni; Teston & Correa, 2015, Check List 11(2): 4.
- Brasil : Pará (Serra do Pardo National Park).

Delphyre hampsoni; Teston & al., 2019, Biota Neotrop. 19(2): 6.
- Brazil : Maranhão (Açailândia), Pará (São Félix do Xingu [Serra do Pardo National Park]), Rondonia (Porto Velho [Madeira River-Aliança]).

Veraneacerea sp. 2 ; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 44, tableau 13.
- Guyane.

Historique. – Rothschild [1912] décrit trois sous-espèces de *Veraneacerea rufiventris* (Schaus, 1894), *V. rufiventris hampsoni* du Pérou (Puno), *V. rufiventris meridensis* du Venezuela (Merida), et *V. rufiventris orientalis* du Rio Madeira (Allianca).
Hampson [1914] considère ces 3 sous-espèces différentes de *V. rufiventris*. Il élève donc *V. hampsoni* au rang d'espèce, *meridensis* et *orientalis* devenant des synonymes de *V. hampsoni*.
Draudt [1916] considère *meridensis* et *orientalis* comme des sous-espèces de *V. hampsoni*.

Rothschild [1912] described three subspecies of *Veraneacerea rufiventris* (Schaus, 1894): *V. rufiventris hampsoni* from Peru (Puno), *V. rufiventris meridensis* from Venezuela (Merida), and *V. rufiventris orientalis* from Rio Madeira (Allianca).
Hampson [1914] considered these three subspecies to be different from *V. rufiventris*. He therefore elevated *V. hampsoni* to the rank of species, with *meridensis* and *orientalis* becoming synonyms of *V. hampsoni*.
Draudt [1916] considered *meridensis* and *orientalis* to be subspecies of *V. hampsoni*.

Notes. – Cerda [2020] considère les genitalia des spécimens de Guyane différents des spécimens de Bolivie identifiés en tant que *V. hampsoni hampsoni*. Les genitalia sont en fait identiques, les spécimens de Guyane sont bien des *V. hampsoni hampsoni*, ce que confirme BOLD avec le séquençage d'un spécimen du Pérou et de Guyane [BOLD : ADL9683].
Un spécimen du Rondonia provenant de la même zone géographique que *V. hampsoni orientalis* a été disséqué, ses genitalia sont identiques à ceux de *V. hampsoni hampsoni*. Nous considérons donc la sous espèce *V. hampsoni orientalis* **stat**. **rev**., **syn**. **conf**. synonyme de *V. hampsoni hampsoni*.
Un spécimen d'Equateur a été disséqué, ses genitalia sont différents de *V. hampsoni hampsoni*, il est donc peut être possible que *V. hampsoni meridensis* soit une *bona species*. Faute d'éléments, nous laissons *meridensis* dans son statut actuel de sous espèce.
Un spécimen du Venezuela (Bolivar) et du Brésil (Espirito Santo) ont été disséqués, leurs genitalia sont identiques à *V. hampsoni hampsoni*.
Photos des holotypes de *Delphyre rufiventris hampsoni*, *Delphyre rufiventris meridensis* et *Delphyre rufiventris orientalis* (NHM) examinées.

Cerda [2020] considers the genitalia of the specimens from French Guiana different from the specimens from Bolivia identified as *V. hampsoni hampsoni*. The genitalia are in fact identical, the specimens from French Guiana are indeed *V. hampsoni hampsoni*, which is confirmed by BOLD with the sequencing of a specimen from Peru and French Guiana [BOLD:ADL9683].
A specimen from Rondonia, originating from the same geographic area as *V. hampsoni orientalis*, was dissected, and its genitalia were identical to those of *V. hampsoni hampsoni*. We therefore considered *V. hampsoni orientalis* **stat**. **rev**., **syn**. **nov**. a synonym of *V. hampsoni hampsoni*.
A specimen from Ecuador was dissected, and its genitalia differed from those of *V. hampsoni hampsoni*. It is therefore possible that *V. hampsoni meridensis* is a distinct species. Lacking sufficient evidence, we maintain *meridensis* in its current subspecies status.
Specimens from Venezuela (Bolivar) and Brazil (Espirito Santo) were dissected, and their genitalia were identical to those of *V. hampsoni hampsoni*.
Photographs of the holotypes of *Delphyre rufiventris hampsoni*, *Delphyre rufiventris meridensis* et *Delphyre rufiventris orientalis* (NHM) have been examined.

Nouveau pour la Guyane.
Espèce capturée au piège lumineux et aux pyrrolizidines.
Species caught at light trap and with pyrrolizidine baits.

Matériel examiné. – 61 spécimens (coll. JAC, TR, BF, BH, TT, ML, OL, SF).

Guyane française

Zone Oyapock : N2 (pk.128[60]) ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, route de Kaw (pk.3,5, 5, 28, 37-38 & 40) ;
Zone Coralie-Cacao : Carbet Coralie (parking d'altitude) ;
Zone Bélizon : Montagne Tortue (450 m) ;
Zone Kourou : Chawari, dégrad Saramaka ;
Zone Sinnamary : Malmanoury ;
Zone Mtgne Trinité : Bénitier ;
Zone Centrale : Saül (Mt. Galbao) ;
Zone Tumuc Humac : Mitaraka sud.

- D'octobre à janvier, mars, juin-juillet.

Brésil

Rondonia, Novembre
Espirito Santo : Tirol-St. Leopoldina, juin, novembre.

Venezuela : Bolivar : Santa Helena.

Bolivie
- Pr. La Paz :
- Rte Camata-Apollo, décembre.
- Rte Coroico-Coripata pk.11, décembre
- Rte Caranavi-Quiquibey, novembre.
- Rte Chulumani-Inquisivi, octobre.
- Rte Caranavi-Yucumo, novembre.
- Pr. Sta Cruz : Rte Sta Cruz - Cochabamba, octobre.

Pérou : Pr. Pasco : Bogaz, octobre.

Equateur : Pastaza : Rio Huapuno, août



Figure 1. Zones de collectes avec les principaux sites de récoltes.

Références

Betz J. T., 1972. – Contribution à la connaissance des Lépidoptères Amatidae de la Guyane française (1). *Annales de la Société entomologique de France*, 8(2): 397 - 407.

Betz J. T., 1974. – Contribution à la connaissance des Lépidoptères Amatidae de la Guyane française (2ème note). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 79: 38 - 42.

Betz J. T., 1980. – Exploration entomologique de la Guyane française et du Moyen Xingu au Brésil LEPIDOPTERA AMATIDAE. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 85: 88 - 93.

Biezanko C. M., 1983. – Ctenuchidae, Nolidae, Arctiidae et Pericopidae da Zona Sueste do Rio Grande Do Sul. *Revista do Centro de Ciências Rurais*, 13(4): 229 - 263.

Blest A. D., 1964. – Protective Display and Sound Production in Some New World Arctiid and Ctenuchiid Moths. *Zoologica*, 49(3): 161 - 181.

Butler A. G., 1876c. – Notes on the Lepidoptera of the Family Zygaenidae, with Descriptions of new Genera and Species. *Journal of the Linnean Society, Zool*., XII: 342 - 433, 3 pl.

Butler A. G., 1877. – Illustrations of typical specimens of Lepidoptera Heterocera in the collection of the British Museum I: 1-62, V-XII, 20 pl.

Butler A. G., 1878b. – On the Lepidoptera of the Amazons, collected by Dr James W. H. Trail during the years 1873 to 1875. *Transactions of the Entomological Society of London*, I: p. 39 - 84.

Cerda J.-A., 2020. – Révision partielle des genres Delphyre, Prosopidia, Mesocerea, Apocerea, Heliura, Eucereon, Euceriodes Hyaleucerea, et Pseudohyaleucerea, comportant la création et revalidation de nombreux genres, avec la description de nouvelles espèces. *Mémoires de la Société Linnéenne de Lyon*, 9 : 153pp., 71 figs., 28 pl. 216 figs.

Delphina M. C. & Teston J. A., 2013. – Arctiinae (Lepidoptera, Arctiidae) Ocorrentes em uma área de pastagem na Amazônia Oriental em Altamira, Pará, Brasil. *Acta Amazonica*, 43(1): 81 - 90.

Dognin P., 1909. – Hétérocère nouveaux de l'Amérique du Sud. *Annales de la Société Entomologique de Belgique*, 53: 213 - 233.

Draudt M., 1916-1917. – *in* Seitz, Macrolépidoptères du Globe, 6. *Stuttgart*: 38 - 293.

Druce H., 1881-1900. – Biologia Centrali-Americana. – Insecta. Lepidoptera - Heterocera. VOL. I (*TEXT.*). *London, Dulau & Co.,Bernard Quaritch* : xxxii + 490 pp.

Druce H., 1905. – Descriptions of some new Species of Syntomidae and Arctiidae from Tropical South America. *Annals and Magazine of Natural History*, (7)XV : 460 - 467.

Ferro V. G. & Diniz I. R. – 2007, Composição de espécies de Arctiidae (Insecta, Lepidoptera) em áreas de Cerrado. *Revista Brasileira de Zoologia*, 24(3): 635 - 646.

Ferro V. G., Resende I. M. H. & Duarte M., 2007. – Arctiidae (Insecta: Lepidoptera) da Estação Biológica de Boracéia (Salesópolis, São Paulo, Brasil). *Biotaneotropica*, 7(3): 331 - 338.

Ferro V. G. & Teston J. A., 2009. – Composição de espécies de Arctiidae (Lepidoptera) no sul do Brasil: relação entre tipos de vegetação e entre a configuração do hábitat. *Revista Brasiliera de Entomologia*, 53(2): 278 - 286.

Ferro V. G., Resende I. M. H. & Duarte M., 2012. – Mariposas Arctiinae (Lepidoptera-Erebidae) do estado de Santa Catarina, Brasil. *Biota Neotropica*, 12(4): 166 - 180.

Fleming H., 1950. – The Euchromiidae (Moths) of Kartabo, British Guiana, and Caripito, Venezuela. *Zoologica*, 35(3): 209 - 216.

Field W. D., 1975. – Ctenuchid Moths of *Ceramidia* Butler, *Ceramidiodes* Hampson, and the Caca species Group of *Antichloris* Hübner. *Smithsonian Contribution to Zoology*, 198: 1 - 45.

Forbes W. T. M., 1939. – The Lepidoptera of Barro Colorado Island, Panama. *Bulletin of the Museum Comparative Zoology, Harvard College*, 85(4): i-viii, 97 - 322.

Grados J., 1997. – Nocturnal Butterflies (Lepidoptera: Heterocera: Ctenuchinae) : Biodiversity Assessment in the Lower Urubamba Region. Biodiversity Assessment. & Monitoring, SI/MAB Serie 1: I-LXXII, 1 - 368.

Grados J., 1999. – Lista preliminar de los Ctenuchinae (Lepidoptera: Arctiidae) de la Zona Reservada Tambopata-Candamo, Madre de Dios, Perú. *Revista Peruana de Entomologia*, 41: 9 - 14.

Grados J., 2001. – Lista de los Ctenuchinae (Lepidoptera: Arctiidae) de la región del Bajo Río Urubamba, Cuzco, Perú. *Revista Peruana de Entomologia*, 42: 61 - 67.

Hagmann G., 1938. – Syntomideos (Amatideos = Euchromideos) do Estado do Para. *Livro Jubilar do professor Lauro Travassos, Rio Janeiro*: 185 - 194.

Hambleton E. J. & Forbes W. T. M., 1935. – Uma lista de Lepidoptera (Heterocera) do Estado de Minas Geraes. *Archivos do instituto Biologico*, 6 (supl.2): 213 - 256.

Hampson G. F., 1898. – Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. 1. *London*: xxi + 559 pp., 285 fig., 17 pl.

Hampson G. F., 1914. – Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. suppl 1. *London*: v-xxviii + 858 pp., 276 fig., 42 pl.

Hoffmann F., 1936. – Beiträge zur Lepidopterenfauna von Sta. Catharina. Syntomidae. *Entomologische Rundschau*, 53(31): 446 - 452.

Kirby W. F., 1892. – A Synonymic Catalogue of Lepidoptera Heterocera. (Moths) Vol. 1: xii + 951 pp.

Korytkowski C. A. & Ojeda D. P., 1970. – Catálogo del Museo de Entomología Vol. 1 No. 3. *Lambayeque - Peru, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo*, 1(3): [i]-[ii] +1-84+[1]-[9]+[i].

Piñas S. J. & Manzano I., 2003. – Mariposas del Ecuador vol. 21b. Familia: Arctiidae. Subfamilia: Ctenuchinae. *Compañía de Jesús*: ii-iii + 91 pp.

Pinheiro L. R., 2016. – Re-evaluation of the identities of *Eucereon punctatum* (Guérin-Méneville, [1844] and *E. Archias* (Stoll, 1790), with a discussion on *E. Mitigatum* Wlaker, 1857, rev. stat. (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Arctiini, Ctenuchina). *Zoosystema*, 38(1): 127 - 140.

Pinheiro L. R., Cerda J.-A. & Duarte M., 2016. – Description of five new species of *Heliura* Butler (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae: Arctiini: Ctenuchina), with discussion on *H. pierus* (Cramer) and the *H. stolli* (Rothschild) species group. *The Canadian Entomologist*, 148: 396 - 415.

Rego Barros A. R. & Machado J. P., 1971. – Estudo dos Ctenuchidae Neotropicais I. Sobre o Gênero Hyaleucerea Butler, 1875 (Lepidoptera-Heterocera). *Arquivos do Museu Nacional*, 54: 171 - 177.

Rothschild L. W., 1912a. – New Syntomidae. *Novitates Zoologicae*, 19(2): 151 - 186.

Schaus W., 1896a. – On Walker's American Types of Lepidoptera in the Oxford University Museum. *Proceedings of the General*

Figure 2. Carte de répartition des espèces en Amérique néotropical.

Meeting for Scientific Business of the Zoological Society of London: 634-650.

Schaus W., 1905. – Descriptions of new South American Moth. *Proccedings of the U. S. National Museum*, 24: 179-205.

Schaus W., 1924. – New species of Moths in the United States National Museum. *Proceeding of the U.S. National Museum*, 65(7): 1-37.

Stoll C., 1780-1782. – *in* Cramer, Supplément à l'ouvrage, intitulé les Papillons Exotiques des trois Parties du Monde l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Pap. Exot. IV.: 1-252, 112 pl.

Silva J. M. & E. Silva J. E., 2014. – Contribuição para o Conheicimento da Fauna de Arctiinae (Lepidoptera: Erebidae) no Estado de Santa Catarina, Brasil. *Entomobrasilis*, 7(3): 222-226.

Teston J. A. & Corseuil E., 2003. – Arctiinae (Lepidoptera, Arctiidae) ocorrentes no Rio Grande Do Sul, Brazil. Parte III. Ctenuchini e Euchromiini. *Biocienscias*, 11(1): 81-90.

Teston J. A. & Corseuil E., 2004. – Diversidade de Arctiinae (Lepidoptera, Arctiidae) capturados com armadilha luminosa, em seis comunidades no Rio Grande Do Sul, Brazil. *Revista Brasiliera de Entomologia*, 48 (1): 77-90.

Teston J. A., Novaes J. B. & Almeida Júnior J. O. B., 2012. – Abundância, Composição e Diversidade de Arctiinae (Lepidoptera, Arctiidae) em um fragmento de floresta na Amazônia Oriental em Altamira, PA, Brasil. *Acta Amazonica*, 42(1): 105-114.

Teston J. A. & Correa D., 2015. – The Arctiini (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae) fauna of the Serra do Pardo National Park, Pará, Brazil. *Check List*, 11(2) 1613: 1-9.

Teston J. A., Abreu D. & Ferro V., 2019. – Arctiini [Leach] (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae) of Brasilian Amazon. III – Subtribe Ctenuchina Kirby, 1837. *Biotaneotropica*, 19(2): 1-19.

Walker F., 1855. – List of the Specimens of Lepidopterous Insects in the Collection of the British Museum. Part III.- Lepidoptera Heterocera: 583-775.

Walker F., 1856. – List of the Specimens of Lepidopterous Insects in the Collection of the British Museum. Part VII.- Lepidoptera Heterocera: 1509-1808.

Zerny H., 1912. – Syntomidae. *Lepidopterum Catalogus*, 7: 179 pp.

Zerny H., 1931a. – Beiträge zur Kenntnis der Syntomiden. *Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris", Dresden* 45: 1-26, 1 pl.

Zerny H., 1931b. – Ergebnisse einer Zoologischen Sammelreise nach Brasilien, Insbesondere in das Amazonzasgebiet, Ausgeführt von Dr. H. Zerny. VII. Teil. Lepidoptera III: Die Syntomiden des Staates Pará. *Annales des Naturhistorischen Museum in Wien*, 45: 225-263.

Zikán C. F., 1928. – Die Macro-Lepidoptera des Itatiaya (Süddabhang bei Campo-Bello). *Entomologisches Rundschau*, 45 (10): 38-39.

Abstract

Cerda J.-A., 2026. – Ctenuchina from French Guiana (Part 2). The genera *Leopardellus* - *Prosopidia* - *Bipartes* - *Apoheliura* - *Passineura* & *Veraneacerea* (Part 3). 20th note. *Faunitaxys*, 14(13) : 1 – 16.

Ten species from French Guiana are treated. Two genera are invented: *Bipartes* **gen**. **nov**., *Leopardellus* **gen**. **nov**. Three species are revised: *Acridopsis lucis* (Butler, 1878) **stat**. **rev**., *Veraneacerea hampsoni orientalis* **(**Rothschild,1912) **stat**. **rev**., *Scepsis trifasciata* Butler, 1877 **stat**. **rev**. Six combinations are new: *Leopardellus quadricolor* (Walker, 1855) **comb**. **nov**., *Leopardellus formosus* (Dognin, 1905) **comb**. **nov**., *Leopardellus dognini* (Rothschild, 1912) **comb**. **nov**., *Bipartes lucis* (Butler, 1878) **comb**. **nov**., *Bipartes peruana* (Pinheiro & Duarte, 2016) **comb**. **nov**., *Passineura trifasciata* (Butler, 1877) **comb**. **nov**. Two synonymies are confirmed: *Veraneacerea hampsoni orientalis* **(**Rothschild,1912) **syn**. **conf**., *Passineura trifasciata* (Butler, 1877) **syn**. **conf**. Three species are new to French Guiana: *Leopardellus quadricolor* (Walker, 1855), *Bipartes lucis* (Butler, 1878), *Veraneacerea hampsoni hampsoni* (Rothschild, 1912).

Keywords. – Erebidae, Arctiinae, Ctenuchina, *Leopardellus*, *Prosopidia*, *Bipartes*, *Apoheliura*, *Passineura*, *Veraneacerea*, taxonomy, French Guiana.

Figure 3. Mtgne de Kaw, soleil couchant.

Derniers articles publiés

Lapèze J., 2025. – Four new species of spittlebugs from French Guiana of the genus *Maxantonia* and *Catrimania* (Hemiptera: Cercopoidea: Ischnorhinidae). *Faunitaxys*, 13(59) : 1 – 16. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-13(59)

Santos-Silva A., Bezark L. G. & Pérez-Flores O., 2025. – Cerambycidae (Coleoptera) from the James Cope collection. Part II: new species and new geographical records. *Faunitaxys*, 13(60) : 1 – 20. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-13(60)

Lourenço W. R. & Velten J., 2025. – The remarkable variability of the genus *Betaburmesebuthus* Lourenço, 2015 from Burmite; comments on newly confirmed morphological characters and description of a new species (Scorpiones: Palaeoburmesebuthidae). *Faunitaxys*, 13(61): 1 – 7. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-13(61)

Háva J., Konvička O., Bobot L. & Brustel H., 2025. – A new *Entoxylon* Ancey, 1869 species from Spain (Coleoptera: Mycetophagidae: Esarcinae). *Faunitaxys*, 13(62): 1 – 8. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-13(62)

Cerda J.-A., 2025. – Ctenuchina de Guyane française (2de partie). Les genres *Ptychotricos* - *Delphyre* - *Druceius* - *Aderithales* - *Moeschlerius* - *Hyaleucerea* - *Nitoris* & *Fraudulentus* (2d article). 18e note. *Faunitaxys*, 13(63) : 1 – 17. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-13(63)

Fleck G., 2026. – An approach to the taxonomy and phylogeny of Oxygastridae sensu Fleck, 2018 based on larval and imaginal morphology (Odonata: Anisoptera). *Faunitaxys*, 14(01) : 1 – 11. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(01)

Coache A. & Lacroix M., 2026. – Un nouveau Sericinae de l'archipel de Sao Tomé et Principe (Coleoptera, Scarabaeoidea, Sericinae). *Faunitaxys*, 14(02) : 1 – 5. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(02)

Deslisle G., 2026. – Birdwing Butterflies NOVA, Part I (Lepidoptera, Papilionidae, Troidini). *Faunitaxys*, 14(03) : 1 – 53. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(03)

Fleck G., 2026. – ERRATA: An approach to the taxonomy and phylogeny of Oxygastridae *sensu* Fleck, 2018 based on larval and imaginal morphology (Odonata : Anisoptera). *Faunitaxys*, 14(04) : 1. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(04)

Vives E., 2026. – Una nueva especie de *Nethinius* Fairmaire, procedente de la Isla Mauritius (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). *Faunitaxys*, 14(05) : 1 – 2. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(05)

Santos-Silva A. & Devesa S., 2026. – On *Lepturgotrichona* Gilmour, 1957 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Faunitaxys*, 14(06) : 1 – 8. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(06)

Audibert C. & Porion T., 2026. – *Scamandra sumbaensis* **n**. **sp**. : une nouvelle espèce de Fulgoridae d'Indonésie (Hemiptera : Fulgoromorpha). *Faunitaxys*, 14(07) : 1 – 2. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(07)

Sabatinelli G., Nuvoli M. T. & Cillo D., 2026. – *Polyphylla ichnusae* new species from Sardinia with notes on Mediterranean *Polyphylla* (Col. Scarabaeidae Melolonthinae Melolonthini). *Faunitaxys*, 14(08) : 1 – 16. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(08)

Davenport C., Grimaldi N. & Pequin O., 2026. – A new subspecies of *Delias patrua* Leech, 1890 (Lepidoptera: Pieridae) from East Laos. *Faunitaxys*, 14(09) : 1 – 6. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(09)

Dalens P.-H. & Robin F., 2026. – Un nouveau genre d'Agapanthiini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Faunitaxys*, 14(10) : 1 – 5. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(10)

Lourenço W. R. & Velten J., 2026. – New considerations about the outstanding variability of the genus *Chaerilobuthus* Lourenço & Beigel, 2011 (Scorpiones: Chaerilobuthidae) and the description of one more new species from Early Cretaceous Burmite. *Faunitaxys*, 14(11): 1 – 6. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(11)

Roguet J.-P., 2026. – Notes sur les Lamiinae du Panama (Coleoptera, Cerambycidae). *Faunitaxys*, 14(12) : 1 – 5. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(12)

Faunitaxys est échangée avec les revues suivantes (« print versions »)

– Annali del Museo Civico di Storia Naturale G. Doria (Italie)
– Boletín de la Asociación española de Entomología (Espagne)
– Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología (Espagne)
– Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia (Italie)
– Bulletin de la Société linnéenne de Lyon (France)
– Bulletin of Insectology (Italie)
– Heteropterus Rev. Entomol. (Espagne)
– Integrative Systematics (Allemagne)
– Israel Journal of Entomology (Israel)
– Klapalekiana (République Tchèque)
– Koleopterologische Rundschau (Allemagne)
– Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (Italie)
– Nova Supplementa Entomologica (Allemagne)
– Proceedings of the Entomological Society of Washington (USA
– Revue suisse de Zoologie (Suisse)
– Spixiana (Allemagne)
– Zoosystematica Rossica (Russie)

Faunitaxys

Volume 14, Numéro 13, Février 2026

SOMMAIRE

Ctenuchina de Guyane française (2de partie). Les genres *Leopardellus* - *Prosopidia* - *Bipartes* - *Apoheliura* - *Passineura* & *Veraneacerea* (3d article). 20e note.

Jean-Aimé Cerda . . . . . 1 – 16

CONTENTS

Ctenuchina from French Guiana (Part 2). The genera *Leopardellus* - *Prosopidia* - *Bipartes* - *Apoheliura* - *Passineura* & *Veraneacerea* (Part 3). 20th note.

Jean-Aimé Cerda . . . . . 1 – 16

Illustration de la couverture :

Buteo platypterus (petite buse).

Crédits:

Jean-Aimé Cerda : Planches 1 & 2.
Michel Laguerre : Planches 3-5.
Jean-Marc Wojcik : Fig. 3.
Nicolas Defaux : Couverture.

Publié par l'Association Française de Cartographie de la Faune et de la Flore (AFCFF)